

インターバル日数： 21 日 基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

肝臓胆嚢膵【制吐薬強化（アロサレジメン名称：GC（GEM+CDDP）療法

レジメン説明：胆道癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27.5m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) KCL注20mEqキット 療法名:GC(GEM+CDDP)療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1L 8m l 20m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	グラセトリン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:GC(GEM+CDDP)療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトリン錠4mgを2日間(制吐剤) 投与順序②	1m g 3.3m g 235m g		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食(500ml) 療法名:GC(GEM+CDDP)療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GC(GEM+CDDP)療法	0m g 100m l		オ-ダ`時						

[illegible]

最大クール数：0クール

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【制吐薬強化（アロサレジメン名称 : GC（GEM+CDDP）療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) KCL注20mEqキット 療法名:GC（GEM+CDDP）療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1L 8m l 20m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	グラセトン点滴静注バ`グ` 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:GC（GEM+CDDP）療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ`カト`ロン錠4mgを2日間(制吐剤) 投与順序②	1m g 3.3m g 235m g		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:GC（GEM+CDDP）療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシ`ル`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GC（GEM+CDDP）療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 100m l		オ-ダ`時						
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GC（GEM+CDDP）療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						