

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称 : GCS療法

レジメン説明 : 胆道癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	25m g /m2		27.5m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) KCL注20mEqキット 療法名:GCS療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1 L 8m l 20m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GCS療法 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デキサメタゾン錠8mgを2日間(制吐剤) 投与順序②	750 μ g 6.6m g		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:GCS療法 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 S-1は1週間のオーダーが必要です 投与順序③	0m g 500m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GCS療法	0m g 100m l		オーダー時						

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【アロカリスなし】 レジメン名称 : GCS療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GCS療法 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						