

肝臓胆嚢膵

レジメン名称 : (免) オブジーボ+ヤーボイ 【肝細胞癌】

レジメン説明 : 肝細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌) オブジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg)	80m g		80m g
02	末梢点滴注射	(癌) ヤーボイ点滴静注液 (20mg, 50mg)	3m g /kg		3.3m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌) オブジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg) 生食 (50mL/袋) 療法名: (免) オブジーボ+ヤーボイ 【肝細胞癌】 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与	0m g 32m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌) ヤーボイ点滴静注液 (20mg, 50mg) 生食 (100mL) 療法名: (免) オブジーボ+ヤーボイ 【肝細胞癌】 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 投与順序② 0.2～1.2μmのインラインフィルターで投与	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名: (免) オブジーボ+ヤーボイ 【肝細胞癌】 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	・ オブジーボ投与終了後30分以上あけてヤーボイを投与 ・ 最終液量計40mLになるように調製
02	・ オブジーボ投与終了後30分以上あけてヤーボイを投与 ・ 最終濃度1～4mg/mLにする
03	ルートキープ時と、オブジーボ投与終了後30分の経過観察時と、ヤーボイ投与終了後のルートフラッシュ

肝臓胆嚢膵

レジメン名称：(免)オプジーボ+ヤーボイ【肝細胞癌】

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

印刷日時： 2025-09-25 19:25:17

最大クール数： 4クール

RP	オーダーコメント
	シュ時に使用