

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 レジメン名称 : Topo+Bev

レジメン説明 : プラチナ製剤抵抗性再発卵巣癌・卵管癌・原発性腹膜癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg	1.25m g /m2		1.375m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)ベパシマブBS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:Topo+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時		
02	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg 生食 (100mL) 療法名:Topo+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時	ホダ時		
03	末梢点滴注射	(癌)ベパシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400mg) 生食 (100mL) 療法名:Topo+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序③	0m g 100m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (250mL) 療法名:Topo+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1	250m l		ホダ時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 レジメン名称 : Topo+Bev

		ルートキープ用									
05	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (100ml)	100ml			ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		

最大クール数：0クール

レジメン名称：Topo+Bev

[illegible]