

産婦人科

レジメン名称 : ドキシル+Bev (4 週毎)

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値						
02	末梢点滴注射	(癌)ベバシ`マブ`BS点滴静注「第一三共」 (100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg						
03	末梢点滴注射	(癌)▲ド`キシル注20mg (10mL) 用時購入	40m g /m2		44m g /m2						

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (5 0mL/袋) デキサート注 6.6mg/V 療法名: ドキシル+Bev (4 週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	50m l 6.6m g		オ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)ベバシ`マブ`BS点滴静注「第一三共」(100mg, 400m 生食 (1 0 0mL) 療法名: ドキシル+Bev (4 週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 2回目60分、3回目以降30分も可 5%TZ配合不可、生食でフラッシュ必要	0m g 100m l		オ`ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)▲ド`キシル注20mg (10mL) 用時購入 ブドウ糖 5 % (2 5 0mL) 療法名: ドキシル+Bev (4 週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与時ルートにフィルター不可 投与前後5%TZフラッシュ必要	0m g 250m l		オ`ダ`時						
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0mL) 療法名: ドキシル+Bev (4 週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		オ`ダ`時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：ドキシル+Bev（4週毎）

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : ドキシル+Bev (4週毎)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		アバスチン前後フラッシュ用									
05	末梢点滴注射	ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:ドキシル+Bev (4週毎) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用 ドキシル前後フラッシュ用	250ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序②
03	投与順序③