

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : ドキシル単剤

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲ドキシル注20mg(10mL)用時購入	50m g /m2		55m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 【 5 0 mL】 デキサート注 6.6mg/V 療法名:ドキシル単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 6.6m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)▲ドキシル注20mg(10mL)用時購入 ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:ドキシル単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与時ルートにフィルター不可 投与順序②	0m g 250m l		12:00						
03	末梢点滴注射	ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:ドキシル単剤 末梢点滴注射: *点滴速度 50ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250m l		ホダ時						