

インターバル日数 : 4 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : MTX単剤 (50mg/m2)

レジメン説明 : 絨毛性疾患

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|-------|--------------------------------------|-----------|-----|-----------|
| 01 | 筋肉内注射 | (癌)メトキシート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) | 50m g /m2 | | 55m g /m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | | | | | | |
|----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 筋肉内注射 | (癌)メトキシート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 蒸留水注(20ml) 療法名:MTX単剤 (50mg/m2) 筋肉内注射: | 0mg 2ml | | 12:00 | | | | | | |