

産婦人科    【非絨毛癌群】    レジメン名称 : ACT-D単剤 (10 μ g/kg)

レジメン説明 : 絨毛性疾患-非絨毛癌群 (low grade GTN)

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184    女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25)    女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(500 μ g)微量用	10 μ g/kg		11 μ g/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	グレースロン点滴静注バツグ 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:ACT-D単剤(10 μ g/kg) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレキントCap 125mg+80mg(4日分) day6-7にテカトロン錠4mg(制吐剤)	1m g 3.3m g		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		
02	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(500 μ g)微量用 蒸留水注( 20ml) 生食 (50mL/袋) 療法名:ACT-D単剤(10 μ g/kg) 末梢点滴注射: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0 μ g 1.1m l 50m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:ACT-D単剤(10 μ g/kg) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		

RP	オーダーコメント
01	投与順序①
02	フィルター不可 (フィルターに吸着するとの報告がある)