

レジメン名称：CPT-11単剤

AUC計算式： 男性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$ 女性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲イリテカ塩酸塩点滴静注液「SUN」 (100mg/5mL)	100m g /m2		110m g /m2

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：CPT-11単剤

[illegible]

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : CPT-11単剤

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	末梢点滴注射	グラセトン点滴静注パック 1mg/50mL 「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:CPT-11単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカドロン錠4mgを2日間(制吐剤)	1m g 3.3m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)▲リリテカン塩酸塩点滴静注液「SUN」(100mg/5mL) 生食 (500ml) 療法名:CPT-11単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 500m l		12:00						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:CPT-11単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①