

産婦人科

レジメン名称 : テブダック

レジメン説明 : 子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)テブダック点滴静注40mg	2m g /kg		2.2m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	グレースロン点滴静注バッグ 1mg/50mL 「HK」 療法名:テブダック 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1m g		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)テブダック点滴静注40mg 蒸留水注(100ml) 生食 (100ml) 療法名:テブダック 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2μmのインラインフィルターで投与 投与開始前に眼科受診必須!	0m g 100m l 100m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:テブダック 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序② ・最大200mg/body。最終濃度は0.7～2.4mg/mLとなるよう希釈 ・投与5分前～投与終了30分後までアイスパックで眼球冷却を行う ・治療中はコンタクトレンズ使用禁止 ・副腎皮質ステロイド点眼を投与24時間前から4日間投与 ・血管収縮点眼剤（プリモニジン/酒石酸塩点眼液0.1%：当院採用はアイファガン）を投与直前に1回

産婦人科

レジメン名称：テブダック

インターバル日数： 21 日

基準日： Day 1

印刷日時： 2025-09-25 19:13:48

最大クール数： 0クール

RP	オーダーコメント
	投与（1-3滴） ・ドライアイ治療用点眼剤を投与開始～投与終了後30日目まで毎日複数回投与