

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 29クール

産婦人科 【ペムブロリズマブ併レジメン名称 : (免)Pem(3週間)

レジメン説明 : 進行・再発子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)Pem(3週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2~5μmのインラインフィルターで投与	0mg 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)Pem(3週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	臨床試験ではペムブロリズマブ投与は最大35サイクル