

産婦人科

レジメン名称 : (免)TP+Bev+Pem

レジメン説明 : 進行・再発子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
04	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」 (30mg, 100mg)	175m g /m2		192. 5m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	50m g /m2		55m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg)	15m g /kg		16. 5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2〜5μmのインラインフィルターで投与	0m g 100m l		オダ時						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	1000m l 8m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) ポララミン注 5mg 療法名:(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレピントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロ錠8mgを3日間(制吐剤)	750μ g 19.8m g 20m g 5m g		オダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」 (30mg, 100mg)	0m g		オダ時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免)TP+Bev+Pem

	<次ページあり>	生食 (500ml)	500ml								
--	----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

レジメン名称：(免)TP+Bev+Pem

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 3時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序④									
05	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	300m l		ホ-ダ`時						
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 （5 0 0 ml） 療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥	0m g 500m l		ホ-ダ`時						
07	末梢点滴注射	(癌)アバスチン注(100mg, 400mg) 生食 （1 0 0 ml） 療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 90分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序⑦	0m g 100m l		ホ-ダ`時						
08	末梢点滴注射	ラクテック（5 0 0 ml） 療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑧	500m l		3回	3回	3回				
09	末梢点滴注射 ＜次ページあり＞	生食 （2 5 0 ml） 療法名：(免)TP+Bev+Pem 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1	250m l		ホ-ダ`時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科 レジメン名称 : (免)TP+Bev+Pem

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		ルートキープ用									

RP	オーダーコメント
01	臨床試験ではペムブリスマブ投与は最大35サイクル
03	投与順序③