

産婦人科 【放射線併用あり】 レジメン名称： (免)Pembro+CCRT (CCRT期)

レジメン説明：局所進行子宮頸癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
05	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	40m g /m2		44m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2〜5μmのインラインフィルターで投与	0mg 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:(免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序②	1000mg 8ml		オーダー時						
03	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:(免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	300ml		オーダー時						
04	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:(免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	750μg 9.9mg 235mg		オーダー時						

最大クール数：2クール

[illegible]

最大クール数：2クール

[illegible]

最大クール数：2クール

[illegible]

最大クール数：2クール

[illegible]

最大クール数：2クール

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 2クール

産婦人科 【放射線併用あり】 レジメン名称 : (免)Pembro+CCRT (CCRT期)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16					
06	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名 : (免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射 : * 点滴時間 2時間で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥ 1本目2時間。2, 3本目80mL/h。	500m l		3回						
07	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名 : (免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射 : * 点滴速度 80ml/h 投与経路 : 末梢静脈メイン 1	500m l			4回					
08	末梢点滴注射	生食 (2 5 0 ml) 療法名 : (免)Pembro+CCRT (CCRT期) 末梢点滴注射 : * 点滴時間 30分で 投与経路 : 末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	最大2年間投与
04	投与順序④