

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : GD

レジメン説明 : 子宮体癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	800m g /m2		880m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)◆ト`セタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	70m g /m2		77m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デ`カト`ロン錠8mgを2日間(浮腫予防) 投与順序①	6.6m g 50m l		ホ`タ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(1 0 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		12:00						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ト`セタセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l								
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ`タ`時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : GD

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (2 5 0 ml)	250m l								
----	--------------------	---------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

最大クール数：0クール

レジメン名称：GD

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : GD

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 5 0 mL】 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカロン錠8mgを2日間(浮腫予防) 投与順序①	6.6m g 50m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)ゲムシレン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤルト」 ブドウ糖 5%(1 0 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		12:00						
03	末梢点滴注射	(癌)◆トセキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		12:30						
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l								
05	末梢点滴注射	生食 (2 5 0ml) 療法名:GD 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	250m l		ホダ時						