

産婦人科

レジメン名称 : DC

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆トセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg)	70m g /m2		75m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	アロキシ点滴静注ハック (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:DC 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプロピタントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序①	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆トセタキセル注「ニプロ」(20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名:DC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠8mg 3日間(浮腫・制吐) 投与順序②	0m g 250m l		10:00						
03	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:DC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		11:00						
04	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:DC 末梢点滴注射: *点滴速度 50ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1	250m l		ホダ時						

産婦人科

レジメン名称 : DC

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール