

産婦人科

レジメン名称 : GC+Bev

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)	4(AUC)		600m g
05	末梢点滴注射	(癌)ベバシズマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400mg)	15m g /kg		16.5m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注 ^{ハック} 0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		オダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l								
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタシン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100mL) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		オダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250mL) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射:	0m g 250m l		オダ時						

最大クール数：0クール

レジメン名称： GC+Bev

[illegible]

レジメン名称： GC+Bev

[illegible]

産婦人科		レジメン名称 : GC+Bev									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	パロチロン点滴静注パツグ® 0.75mg/50mL 「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミタムCap 125mg+80mg(2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g								
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		午後時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタレン点滴静注液(200mg, 1g) 「ヤルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		午後時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l								
05	末梢点滴注射	(癌)ヘパシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400mg) 生食 (100ml) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序④	0m g 100m l								
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (250ml)	250m l								

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科 レジメン名称 : GC+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用									
07	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:GC+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①