

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : TA+Bev

レジメン説明 : TC+BevあるいはTP+Bev療法中にCBDCAあるいはCDDP過敏症を併発した卵巢癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)	175m g /m2		192.5m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)▲アクプラ(10mg, 50mg, 100mg)	80m g /m2		88m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)ベバシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400mg)	7.5m g /kg		8.25m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V ファモチジン静注液20mg「サイ」(20mg/20mL) ポラミン注 5mg 療法名:TA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① デカドロン錠8mgを2日間(制吐剤)	750 μ g 19.8m g 20m g 5m g		ホータ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名:TA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 500m l		12:00						
03	末梢点滴注射	(癌)▲アクプラ(10mg, 50mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名:TA+Bev 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		15:00						
04	末梢点滴注射	(癌)ベバシマブBS点滴静注「第一三共」(100mg, 400m	0m g		17:00						

産婦人科

レジメン名称 : TA+Bev

	<次ページあり>	生食 (100ml) 療法名:TA+Bev	100ml								
--	----------	--------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : TA+Bev

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		末梢点滴注射： ＊点滴時間 90分で 投与経路：末梢静脈メイン1側管 2回目60分、3回目以降30分も可 投与順序④									
05	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名：TA+Bev 末梢点滴注射： ＊点滴速度 100ml/h 投与経路：末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500ml		3回						
06	末梢点滴注射	生食 (500ml) 療法名：TA+Bev 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン1 ルートキープ用	500ml		1回						

RP	オーダーコメント
04	ラクテックと配合禁忌のため、投与前後は生食でフラッシュが必要