

産婦人科

レジメン名称 : トポテカン単剤

レジメン説明 : 卵巣癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg	1.5m g /m2		1.65m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:トポテカン単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		
02	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg 生食 (100ml) 療法名:トポテカン単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 100m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:トポテカン単剤 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		