

産婦人科

レジメン名称 : EMA/CO

レジメン説明 : 絨毛癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(0.5mg) 要予約	0.5m g		0.5m g
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」	100m g /m2		110m g /m2
05	末梢点滴注射	(癌)▲トリセート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	300m g /m2		330m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1 mg)	1m g /m2		2m g
07	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(5 0 0mg)	600m g /m2		660m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注パグ 0.75mg/50mL 「タイ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	750 μ g 6.6m g		オダ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (5 0 mL/袋) 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	6.6m g 50m l			オダ時					
03	末梢点滴注射	(癌)◆コスメゲン(0.5mg) 要予約 蒸留水注(2 0ml) 生食 (5 0 mL/袋) 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② Day3-4にテカト 8mg必要(制吐剤)	0m g 1.1m l 50m l		オダ時	オダ時					
04	末梢点滴注射	(癌)▲エトポシド点静 100mg 「サト」 生食 (5 0 0ml)	0m g 500m l		オダ時	オダ時					

最大クール数：0クール

レジメン名称：EMA/CO

[illegible]

レジメン名称：EMA/CO

[illegible]

レジメン名称：EMA/CO

[illegible]

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : EMA/CO

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
06	末梢点滴注射	(癌)◆オンコビン(1mg) 生食 (50mL/袋) 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0mg 50m l		オーダー時						
07	末梢点滴注射	(癌)▲エンドキサン(500mg) 生食 (250ml) 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③ Day9-10 テカトロン8mg必要(制吐剤)	0mg 250m l		オーダー時						
08	末梢点滴注射	生食 (500ml) 療法名:EMA/CO 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	500m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
03	フィルター不可 (フィルターに吸着するとの報告がある)
05	投与順序④