

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : MTX単剤(0.4mg/kg)

レジメン説明 : 侵入奇胎

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	筋肉内注射	(癌)リトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg)	0.4m g /kg		25m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	筋肉内注射	(癌)リトレキート (5mg, 50mg, 200mg, 1000mg) 蒸留水注(20ml) 療法名:MTX単剤(0.4mg/kg) 筋肉内注射:	0mg 2ml		ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時	ホ-タ`時		