

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : Topo+CDDP

レジメン説明 : 進行・再発子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg	0.75m g /m2		0.825m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	50m g /m2		55m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	末梢点滴注射	生食(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml(20ml) 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	アキシ点滴静注パッケ (0.75mg/50mL) デキサート注 6.6mg/V 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレキントCap 125mg+80mg(2日分) 投与順序②	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
03	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 【 50 mL】 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6m g 50m l			ホダ時	ホダ時	ホダ時			
04	末梢点滴注射	(癌)▲ハイカムチン注射用1.1mg 生食 (100ml) 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	0m g 100m l		ホダ時	ホダ時	ホダ時				



インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : Topo+CDDP

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		投与順序③									
05	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	300m l		ホ-ダ`時						
06	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	0m g 500m l		ホ-ダ`時						
07	末梢点滴注射	生食 (5 0 0 ml) 療法名:Topo+CDDP 末梢点滴注射: *点滴速度 60ml/h 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	500m l		3回	3回	3回				