

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

レジメン説明 : 子宮頸癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	40m g /m2		44m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	パロチロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレタンCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750μ g 9.9m g		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

05	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500ml)	500ml		3回						
----	--------------------	---------------	-------	--	----	--	--	--	--	--	--

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly CDDP (CCRT)

[illegible]

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイ秒」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間 (制吐剤)	750 μ g 9.9m g		オダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						
05	末梢点滴注射	ラクテック (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		3回						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射:	500m l			4回					

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly CDDP (CCRT)

[illegible]

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイ秒」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間 (制吐剤)	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						
05	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		3回						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射:	500m l			4回					

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly CDDP (CCRT)

[illegible]

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25	Day26	Day27	Day28
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイ秒」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間 (制吐剤)	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						
05	末梢点滴注射	ラクテック (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		3回						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射:	500m l			4回					

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly CDDP (CCRT)

[illegible]

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day29	Day30	Day31	Day32	Day33	Day34	Day35
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	パロリトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイ秒」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						
05	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		3回						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射:	500m l			4回					

最大クール数：0クール

レジメン名称：weekly CDDP (CCRT)

[illegible]

インターバル日数 : 42 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37					
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 シスプラチン投与前に点滴開始 投与順序①	1000m l 8m l		1回						
02	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	300m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	パロセトン点滴静注バッグ 0.75mg/50mL 「タイ秒」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750 μ g 9.9m g		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0m g 500m l		12:00						
05	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤	500m l		3回						
06	末梢点滴注射 <次ページあり>	ラクテック(500ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射:	500m l			4回					

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

産婦人科

レジメン名称 : weekly CDDP (CCRT)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day36	Day37					
		*点滴速度 80ml/h 投与経路:末梢静脈メイン 1									
07	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:weekly CDDP (CCRT) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
03	投与順序③