

インターバル日数： 21 日 基準日： Day 1

最大クール数： 6クール

産婦人科

レジメン名称： (免)TC+Pem

レジメン説明： 進行・再発子宮頸癌

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
03	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」 (30mg, 100mg)	175m g /m2		192. 5m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)TC+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2～5μmのインラインフィルターで投与	0m g 100m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	パロノセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V ファモチジン静注液20mg「サリ」 (20mg/20mL) ポララミン注 5mg 療法名:(免)TC+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アプレミントCap 125mg+80mg (2日分) デカトロン錠8mgを3日間(制吐剤)	750μ g 19.8m g 20m g 5m g		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆パクリタセル注「NK」 (30mg, 100mg) 生食 (500ml) 療法名:(免)TC+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.22μm以下のインラインフィルターで投与 投与順序③	0m g 500m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	0m g		オーダー時						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科 レジメン名称 : (免)TC+Pem

	<次ページあり>	生食 (250ml)	250ml								
--	----------	------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免)TC+Pem

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:(免)TC+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名:(免)TC+Pem 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	臨床試験ではペムブロシマブ投与は最大35サイクル
02	投与順序②