

産婦人科

レジメン名称 : (免)ヘムブ`ロリス`マブ`+リンパ`チニブ` (6週間)

レジメン説明 : プラチナ製剤を含む化学療法歴のある進行/再発子宮体癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	400m g		400m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名:(免)ヘムブ`ロリス`マブ`+リンパ`チニブ` (6週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 リンパ`チニブ` :1日1回20mg、連日内服 ヘムブ`ロリス`マブ`投与は最大2年間	0m g 100m l		ホ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)ヘムブ`ロリス`マブ`+リンパ`チニブ` (6週間) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホ`ダ`時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序① 0.2～5μmのインラインフィルターで投与