

産婦人科

レジメン名称 : (免) Pembro+DC

レジメン説明 : 子宮内膜癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g
03	末梢点滴注射	(癌)◆トセタセル注「ニプロ」 (20mg, 80mg)	70m g /m2		77m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100ml) 療法名: (免) Pembro+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序① 0.2〜5μmのインラインフィルターで投与	0m g 100m l		ホダ時						
02	末梢点滴注射	パロセトロン点滴静注バック0.75mg/50mL「タイバ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名: (免) Pembro+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② デカトロン錠8mg 3日間(浮腫・制吐)	750μ g 9.9m g 235m g		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆トセタセル注「ニプロ」 (20mg, 80mg) 生食 (250ml) 療法名: (免) Pembro+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン「NK」 (50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名: (免) Pembro+DC	0m g 250m l		ホダ時						

最大クール数：6クール

レジメン名称：（免）Pembro+DC

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免) Pembro+DC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		* 点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (2 5 0ml) 療法名:(免) Pembro+DC 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250m l		ホダ時						