

産婦人科

レジメン名称 : (免) テ`ュルハ`ルマブ`+DC

レジメン説明 : 子宮内膜癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1120m g		1120m g
03	末梢点滴注射	(癌)◆ト`セタ`セル注「ニ`ロ」 (20mg, 80mg)	70m g /m2		77m g /m2
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ`ブ`ラチン「NK」 (50, 150, 450mg)	5 (AUC)		750m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名: (免) テ`ュルハ`ルマブ`+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2~0.22μmのインラインフィルターで投与 投与順序①	0m g 250m l		ホ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	パ`ロセトロン点滴静注バ`ック`0.75mg/50mL「タイイ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名: (免) テ`ュルハ`ルマブ`+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② デ`カト`ロン錠8mg 3日間(浮腫・制吐)	750μ g 9.9m g 235m g		ホ`ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)◆ト`セタ`セル注「ニ`ロ」 (20mg, 80mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名: (免) テ`ュルハ`ルマブ`+DC 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 250m l		ホ`ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)▲カルボ`ブ`ラチン「NK」 (50, 150, 450mg) 生食 (2 5 0ml) 療法名: (免) テ`ュルハ`ルマブ`+DC	0m g 250m l		ホ`ダ`時						

最大クール数：6クール

レジメン名称：(免) テ`ュルハ`ルマフ`+DC

[illegible]

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 6クール

産婦人科

レジメン名称 : (免) デュルハルマブ +DC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		* 点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④									
05	末梢点滴注射	生食 (250ml) 療法名: (免) デュルハルマブ +DC 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250ml		ホダ時						