

産婦人科    【ステロイド・スペアリング】レジメン名称 : tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)

レジメン説明 : 卵巣癌  
(DMなどでステロイドスペアリングが望ましい症例)

適用条件 :  
除外条件 :  
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184  
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技     | 薬剤名称                            | 標準値(1回量)   | 標準値 | 上限値          |
|----|--------|---------------------------------|------------|-----|--------------|
| 02 | 末梢点滴注射 | (癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)    | 175m g /m2 |     | 192.5m g /m2 |
| 03 | 末梢点滴注射 | (癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg) | 6(AUC)     |     | 900m g       |

| RP | 手技     | 薬剤名称   | 用量/単位   | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------|--|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 末梢点滴注射 | パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」<br>ファモチジン静注液20mg「サリ」(20mg/20mL)<br>デキサート注 6.6mg/V<br>ポララミン注 5mg<br>アロカリス点滴静注(235mg/10mL)<br>療法名:tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)<br>末梢点滴注射:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢静脈メイン1側管<br>投与順序① | 750 μ g<br>20m g<br>19.8m g<br>5m g<br>235m g |       | ホ-ダ`時 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 末梢点滴注射 | (癌)◆パクリタセル注「NK」(30mg, 100mg)<br>生食 (500ml)<br>療法名:tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)<br>末梢点滴注射:<br>*点滴時間 3時間で<br>投与経路:末梢静脈メイン1側管<br>0.22 μ m以下のインラインフィルターで投与<br>投与順序②   | 0m g<br>500m l                                |       | 10:00 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 末梢点滴注射 | (癌)▲カルボプラチン「NK」(50, 150, 450mg)<br>生食 (250ml)<br>療法名:tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)<br>末梢点滴注射:<br>*点滴時間 1時間で<br>投与経路:末梢静脈メイン1側管<br>投与順序③  | 0m g<br>250m l                                |       | 13:00 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 末梢点滴注射 | 生食 (250ml)<br>療法名:tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)  | 250m l  |       | ホ-ダ`時 |  |  |  |  |  |  |

最大クール数：0クール

産婦人科 【ステロイド・スペアリング】レジメン名称: tri-weeklyTC (ステロイド・スペアリング)

[illegible]

