

歯科口腔外

レジメン名称 : 【適外】CDDP (動注) +RT

レジメン説明 : 頭頸部癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	末梢点滴注射	(癌)デトキソール(2 g / 2 0ml) レジメン用	9 g /m2		9.9 g /m2
05	動脈注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	100m g /m2		110m g /m2
06	末梢点滴注射	(癌)デトキソール(2 g / 2 0ml) レジメン用	12 g /m2		13.2 g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	大塚生食注(1 L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:【適外】CDDP (動注) +RT 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パ`ロ/セトロン点滴静注パ`ック`0.75mg/50mL「タイホ」 療法名:【適外】CDDP (動注) +RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序② アプ`レビ`タントCap125mg+80mg(2日間)	9.9m g 750 μ g		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:【適外】CDDP (動注) +RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	300m l		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)デトキソール(2 g / 2 0ml) レジメン用 療法名:【適外】CDDP (動注) +RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序④	0 g		オ-ダ`時						

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】CDDP（動注）+RT

[illegible]

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】 CDDP（動注）+RT

[illegible]

歯科口腔外		レジメン名称：【適外】CDDP（動注）+RT									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11	Day12	Day13	Day14
01	末梢点滴注射	大塚生食注（1 L） 硫酸Mg補正液1mEq/ml（20ml） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ﾀﾞ時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パ-ロ/セトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎﾞ」 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② ｱﾌﾟﾚ-ﾀﾝﾄCap125mg+80mg（2日間）	9.9m g 750μ g		オ-ﾀﾞ時						
03	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	300m l		オ-ﾀﾞ時						
04	末梢点滴注射	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④ シスプラチンと同時に開始	0 g		オ-ﾀﾞ時						
05	動脈注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 動脈注射： その他 投与順序④ 0.5mL/sec	0m g		オ-ﾀﾞ時						
06	末梢点滴注射  ＜次ページあり＞	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で	0 g		オ-ﾀﾞ時						

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】 CDDP（動注）+RT

[illegible]

インターバル日数： 35 日 基準日： Day 1 最大クール数： 4クール

歯科口腔外

レジメン名称：【適外】CDDP（動注）+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15	Day16	Day17	Day18	Day19	Day20	Day21
01	末梢点滴注射	大塚生食注（1 L） 硫酸Mg補正液1mEq/ml（20ml） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ﾀﾞ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パ`ロ/セトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎﾞ」 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② ｱﾌﾟﾚ`ﾀﾝﾄCap125mg+80mg（2日間）	9.9m g 750μ g		オ-ﾀﾞ`時						
03	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	300m l		オ-ﾀﾞ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④ シスプラチンと同時に開始	0 g		オ-ﾀﾞ`時						
05	動脈注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 動脈注射： その他 投与順序④ 0.5mL/sec	0m g		オ-ﾀﾞ`時						
06	末梢点滴注射  ＜次ページあり＞	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で	0 g		オ-ﾀﾞ`時						

最大クール数：4クール

レジメン名称：【適外】 CDDP（動注）+RT

[illegible]

歯科口腔外		レジメン名称：【適外】CDDP（動注）+RT									
RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25			
01	末梢点滴注射	大塚生食注（1 L） 硫酸Mg補正液1mEq/ml（20ml） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①	1000m l 8m l		オ-ﾀﾞ`時						
02	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パ`ロ/セトロン点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ0.75mg/50mL「ﾀｲﾎﾞ」 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序② ｱﾌﾟﾚ`ﾀﾝﾄCap125mg+80mg（2日間）	9.9m g 750μ g		オ-ﾀﾞ`時						
03	末梢点滴注射	マンニトールS注射液（300mL/袋） 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序③	300m l		オ-ﾀﾞ`時						
04	末梢点滴注射	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④ シスプラチンと同時に開始	0 g		オ-ﾀﾞ`時						
05	動脈注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 動脈注射： その他 投与順序④ 0.5mL/sec	0m g		オ-ﾀﾞ`時						
06	末梢点滴注射  ＜次ページあり＞	(癌)デトキシソール（2 g / 2 0ml） レジメン用 療法名：【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で	0 g		オ-ﾀﾞ`時						



インターバル日数 : 35 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 4クール

歯科口腔外

レジメン名称 : 【適外】CDDP（動注）+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day22	Day23	Day24	Day25			
		投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑤									
07	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序⑥	500ml		4回						
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン1 投与順序①	500ml			3回	3回				
09	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	6.6mg 50ml			オーダー時	オーダー時	オーダー時			
10	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:【適外】CDDP（動注）+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時			オーダー時			

RP	オーダーコメント
05	デトキソール(9g/m <sup>2</sup> )と同時に開始