

医薬品安全使用ニュース

オーツカMV注、ビタジェクト注キットの 投与時の注意点について

【効能効果】

経口・経腸管栄養補給が不能又は不十分で高カロリー静脈栄養に
頼らざるを得ない場合のビタミン補給



概要

高カロリー輸液用総合ビタミン剤であるオーツカMV注、
ビタジェクト注キットは、薬剤部で高カロリー輸液を調製
した場合も、**病棟で用時混合する必要があります**

※添付文書上、「高カロリー静脈栄養輸液に混合後、通常12時間以内に
投与を終了すること」と記載されております

注意すべきポイント

当院において、用時混合が必要なオーツカMV注が、
薬剤部で調製した高カロリー輸液製剤に未混合のまま
投与された事例が報告されております

薬剤部で調製した高カロリー輸液製剤の払い出しのイメージ図

調製した高カロリー輸液製剤を入れた遮光袋に、輸液ラベルを貼付し、処方箋控えと用時混合の薬剤をセットして交付

RP 1	IVH(調製)	
	ハイカリック2号 (700ml)	700ml
	アミパレン(200ml)	200ml
	エレジェクトシリンジ(2ml)	2ml
	○ビタジェクト注	1本
14:00		
中心静脈注射(無菌調製):		
*点滴時間 24時間で		
投与経路:中心静脈シングル		
混合済		
ただし、用時混合注射薬は、 病棟にて、混合して下さい。		
【診療科 控元】 薬剤部 製剤室		



IVH(調製)	
ハイカリック2号 (700ml)	700 ml
アミパレン(200ml)	200 ml
エレジェクトシリンジ(2ml)	2 ml
○ビタジェクト注	1 本
中心静脈注射(無菌調製):	
*点滴時間 24時間で	
投与経路:中心静脈シングル	
混合済 ○印の薬剤は用時添加	

○印の薬剤は用時混合
が必要な薬剤です

投与時にはビタミンの光分解を防ぐため遮光してください

高カロリー輸液以外の薬剤との混合や、単独投与、末梢静脈からの投与は避けてください