

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【制吐薬強化（アロプリジン名称 : nab-PTX+ゲムシタビン(q4w)

レジメン説明 : 治癒切除不能な膵癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)◆アブラキサン点滴静注用100m g	125m g /m2		137.5m g /m2
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	グラセトン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 デカトロン錠4mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 3.3m g 235m g		オダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆アブラキサン点滴静注用100m g 生食 (100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与時ルートにフィルター不可 薬液量確認の上、投与速度を設定	0m g 100m l		オダ時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 100m l		オダ時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		オダ時						

最大クール数：0クール

[illegible]

最大クール数：0クール

[illegible]

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

肝臓胆嚢膵【制吐薬強化（アロプレジメン名称 : nab-PTX+ゲムシタビン(q4w)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	末梢点滴注射	ゲマシタビン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 ゲマシタビン錠4mgを2日間(制吐剤) 投与順序①	1m g 3.3m g 235m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)◆アプレキソン点滴静注用100m g 生食 (100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与時ルートにフィルター不可 薬液量確認の上、投与速度を設定	0m g 100m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタビン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 100m l		オーダー時						
04	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:nab-PTX+ゲムシタビン(q4w) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序②