

肝臓胆嚢膵【肝移植】                      レジメン名称 : リツキサン（肝移植）

レジメン説明 : ABO血液型不適合・抗ドナー抗体強陽性肝移植

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg)	375m g /m2		412.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食（50mL/袋） ボララミン注 5mg 療法名:リツキサン（肝移植） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アセトアミノフェンの内服が必要です 投与順序①	50m l 5m g		ホダ時						
02	静脈内注射	ソルコーテフ(100mg) 生食注シリンジ「オーツカ」 20mL 療法名:リツキサン（肝移植） 静脈内注射: 投与順序②	100m g 20m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	(癌) リツキサン(100mg, 500mg) 生食（500ml） 療法名:リツキサン（肝移植） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 7時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序③	0m g 500m l		ホダ時						
04	末梢点滴注射	生食（1000ml） 療法名:リツキサン（肝移植） 末梢点滴注射: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						