

肝臓胆嚢膵

レジメン説明 : 肝細胞癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg)	480m g		480m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌) オプジーボ点滴静注 (20mg, 120mg, 240mg) 生食 (100ml) 療法名: (免) オプジーボ (480mg/body) 【肝細胞癌】 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1側管 0.2~0.22μmのインラインフィルターで投与	0mg 100ml		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名: (免) オプジーボ (480mg/body) 【肝細胞癌】 末梢点滴注射: * 点滴時間 30分で 投与経路: 末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	臨床試験ではオプジーボは最大2年間投与した