

泌尿器科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+パドセブ

レジメン説明 : 尿路上皮癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg)	1. 25m g /kg		1. 375m g /kg
03	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg)	200m g		200m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	デキサート注 6. 6mg/V 生食 (5 0mL/袋) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6. 6m g 50m l		オ-ダ`時						
02	末梢点滴注射	(癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg) 蒸留水注(1 0 0ml) 生食 (1 0 0ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 最終濃度は0. 3~4mg/mL 最大125mg/body	0m g 100m l 100m l		オ-ダ`時						
03	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (1 0 0ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0. 2~5 μ mのインラインフィルタ-で投与 投与順序③	0m g 100m l		オ-ダ`時						
04	末梢点滴注射	生食 (1 0 0ml) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で	100m l		オ-ダ`時						

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+パドセブ

[illegible]

最大クール数：0クール

レジメン名称：(免)キイトルーダ+パドセブ

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : (免)キイトルーダ+パドセブ

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	6.6mg 50mL		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)▲パドセブ点滴静注用 (20mg, 30mg) 蒸留水注 (100mL) 生食 (100mL) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 最終濃度は0.3～4mg/mL 最大125mg/body	0mg 100mL 100mL		オーダー時						
03	末梢点滴注射	(癌)キイトルーダ点滴静注 (100mg, 20mg) 生食 (100mL) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～5μmのインラインフィルターで投与 投与順序③	0mg 100mL								
04	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名:(免)キイトルーダ+パドセブ 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100mL		オーダー時						

RP	オーダーコメント
02	投与順序②
03	KEYNOTE-A39試験/EV-302試験では、キイトルーダは最大35サイクル、パドセブは投与サイクル上限なし。