

泌尿器科 【術前・術後】 レジメン名称 : (免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59)

レジメン説明 : 膀胱癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1500m g		1500m g
05	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液 (200mg, 1g) 「ヤクルト」	1000m g /m2		1100m g /m2
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg	35m g /m2		38.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (250ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 体重≤30kgの1回投与量は20mg/kg 投与順序①	0m g 250m l		ホ`ダ`時						
02	末梢点滴注射	大塚生食注(1L) 硫酸Mg補正液1mEq/ml (20ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	1000m l 8m l		ホ`ダ`時						
03	末梢点滴注射	パ`ロセトロン点滴静注パ`ック`0.75mg/50mL 「タイホ」 デキサート注 6.6mg/V アロカリス点滴静注(235mg/10mL) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 ホ`ンサ`ビ`ン5mg (day1-4, 8-11) 考慮 投与順序③	750μ g 9.9m g 235m g		ホ`ダ`時						
04	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V 生食 (50mL/袋) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59)	6.6m g 50m l			ホ`ダ`時	ホ`ダ`時	ホ`ダ`時			

最大クール数：4クール

レジメン名称：(免)デュールハルマブ+GC 術前 (CCr40-59)

[illegible]

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 4クール

泌尿器科 【術前・術後】

レジメン名称 : (免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
		*点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序①									
05	末梢点滴注射	(癌)ゲムシタ`ン点滴静注液(200mg, 1g)「ヤクルト」 ブドウ糖 5%(100ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序④	0mg 100ml		オ`ダ`時						
06	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	300ml		オ`ダ`時						
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (500ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥	0mg 500ml		オ`ダ`時						
08	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑦	500ml		2回						
09	末梢点滴注射	ラクテック(500ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	500ml			3回	3回				
10	末梢点滴注射 <次ページあり>	生食 (250ml) 療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射:	250ml		オ`ダ`時						

最大クール数：4クール

レジメン名称：(免)デ`ュルハ`ルマフ`+GC 術前 (CCr40-59)

[illegible]

基準日： Day 1

最大クール数：4クール

レジメン名称：(免)テ`ュルハ`ルマフ`+GC 術前 (CCr40-59)

[illegible]

泌尿器科 【術前・術後】 レジメン名称： (免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11			
06	末梢点滴注射	マンニトールS注射液 (300mL/袋) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑤	300m l		オ-ダ`時						
07	末梢点滴注射	(癌)▲シスプラチン注10mg, 50mg 生食 (5 0 0 ml) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 2時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑥	0m g 500m l		オ-ダ`時						
08	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序⑦	500m l		2回						
09	末梢点滴注射	ラクテック (5 0 0 ml) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 6時間で 投与経路：末梢静脈メイン 1 側管 投与順序②	500m l			3回	3回				
10	末梢点滴注射	生食 (2 5 0 ml) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	250m l								
11	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名：(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) 末梢点滴注射： ＊点滴時間 30分で 投与経路：末梢静脈メイン 1 ルートキープ用	100m l		オ-ダ`時			オ-ダ`時			
12	ヘパリンロック <次ページあり>	ヘ`リンNaロ`ック用 10 単位/mL 10ml	10m l			1回	1回				

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 4クール

泌尿器科 【術前・術後】 レジメン名称 : (免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8	Day9	Day10	Day11			
		療法名:(免)デ`ュルハ`ルマブ`+GC 術前 (CCr40-59) ヘパリンロック: 末梢静脈 ヘパリンロック									

RP	オーダーコメント
01	0.2～0.22 μ mのインラインフィルターで投与