

泌尿器科 【術前・術後】 レジメン名称 : (免)デュルバルマブ 術後アジュバント用

レジメン説明 : 膀胱癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg)	1500m g		1500m g

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	(癌)イミフィンジ点滴静注 (120mg, 500mg) 生食 (250ml) 療法名:(免)デュルバルマブ 術後アジュバント用 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 最大8コースまで 体重≤30kgの1回投与量は20mg/kg	0m g 250m l		オーダー時						
02	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:(免)デュルバルマブ 術後アジュバント用 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	0.2~0.22μmのインラインフィルターで投与 投与順序①