

泌尿器科 【尿膜管癌（基準外）】レジメン名称 : 【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め

レジメン説明 : 尿膜管癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	中心静脈側管	(癌)レボリナート点滴静注用「NK」(25mg, 100mg)	200m g /m2		220m g /m2
03	中心静脈側管	(癌)◆オキサリプラチン点滴静注液 (50mg, 100mg)「NK」	85m g /m2		93.5m g /m2
04	中心静脈側管	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーフ」	400m g /m2		440m g /m2
05	中心静脈持続側管	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーフ」	2400m g /m2		2640m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈側管	グラネキソン点滴静注バッグ 1mg/50mL「HK」 デキサート注 6.6mg/V 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈側管: *点滴時間 15分で 投与経路:中心静脈シングル側管 アプレミントCap 125mg+80mg(2日分) デカドロン錠4mgを2日間(制吐剤)	1m g 3.3m g		10:15						
02	中心静脈側管	(癌)レボリナート点滴静注用「NK」(25mg, 100mg) ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈側管: *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈シングル側管 投与順序②	0m g 250m l		10:30						
03	中心静脈側管	(癌)◆オキサリプラチン点滴静注液 (50mg, 100mg)「NK」 ブドウ糖 5%(250ml) 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈側管: *点滴時間 2時間で 投与経路:中心静脈シングル側管 投与順序②	0m g 250m l		10:30						
04	中心静脈側管	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トーフ」 生食 (100ml) 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈側管:	0m g 100m l		12:30						



インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 0クール

泌尿器科 【尿膜管癌（基準外）レジメン名称 : 【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		投与経路:中心静脈シングル側管 投与順序③ 全開で投与									
05	中心静脈持続側管	(癌)▲フルオロウラシル注 1000m g 「トロー」 生食 (100ml) 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈持続側管: *点滴時間 46時間で 投与経路:中心静脈シングル持続側管 type T(流速3.7mL/hr):総量140mL 投与順序④	0mg 140ml		12:35						
06	中心静脈メイン	生食 (100ml) 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 中心静脈注射 (メイン): *点滴時間 30分で 投与経路:中心静脈シングル ルートキープ用	100ml		オーダー時						
07	静脈内注射	ヘリンロック用 100 単位/mL 10ml 療法名:【適外】 mFOLFOX6ポンプ 詰め 静脈内注射: 46hrポンプ 終了後のヘリンロック day3に使用	10ml		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①