

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : カバジタキセル

レジメン説明 : 前立腺癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲ジェブタナ点滴静注60mg	25m g /m2		27.5m g /m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (5 0 mL/袋) ファモチジン静注液20mg「サリイ」(20mg/20mL) デキサート注 6.6mg/V ボララミン注 5mg 療法名:カバジタキセル 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	50m l 20m g 6.6m g 5m g		10:00						
02	末梢点滴注射	(癌)▲ジェブタナ点滴静注60mg ブドウ糖 5%(2 5 0 ml) 療法名:カバジタキセル 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2～0.22μmのインラインフィルターで投与 投与順序②	0m g 250m l		10:15						
03	末梢点滴注射	生食 (1 0 0 ml) 療法名:カバジタキセル 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		10:00						