

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

泌尿器科

レジメン名称 : (免)アベルマブ+アキシチニブ併用

レジメン説明 : 腎癌

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)バベンチオ点滴静注 200mg/10mL	10m g /kg		11m g /kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	末梢点滴注射	生食 (50mL/袋) ポラミン注 5mg 療法名:(免)アベルマブ+アキシチニブ併用 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 アキシニブのオーダーが必要です 1回5mg 1日2回連日内服	50m l 5m g		オーダー時						
02	末梢点滴注射	(癌)バベンチオ点滴静注 200mg/10mL 生食 (250mL) 療法名:(免)アベルマブ+アキシチニブ併用 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 0.2μmのインラインフィルターで投与 アセトアミノフェン600mgの内服が必要です	0m g 250m l		オーダー時						
03	末梢点滴注射	生食 (100mL) 療法名:(免)アベルマブ+アキシチニブ併用 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		オーダー時						

RP	オーダーコメント
01	投与順序①
02	投与順序②