

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

AUC計算式： 男性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$  女性用： $AUC \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン注射液「NK」(50, 150, 450mg)	1.5(AUC)		225m g

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

[illegible]

最大クール数：1クール

レジメン名称：weeklyCBDCA+RT

[illegible]

インターバル日数 : 43 日 基準日 : Day 1 最大クール数 : 1クール

歯科口腔外

レジメン名称 : weeklyCBDCA+RT

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day43						
01	末梢点滴注射	デキサート注 6.6mg/V パロセトロン点滴静注パック0.75mg/50mL「タイバ」 療法名:weeklyCBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序①	9.9m g 750 μ g		ホダ時						
02	末梢点滴注射	(癌)▲カルボプラチン注射液「NK」(50, 150, 450mg) 生食 (250ml) 療法名:weeklyCBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢静脈メイン1側管 投与順序②	0m g 250m l		ホダ時						
03	末梢点滴注射	生食 (100ml) 療法名:weeklyCBDCA+RT 末梢点滴注射: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢静脈メイン1 ルートキープ用	100m l		ホダ時						