バイオ後続品が存在する当院採用バイオ医薬品一覧 ver.1.0

DIニュース 2026年10月1号

愛媛大学医学部附属病院 薬剤部

20261025作成 ※転用禁止

置き換え率※	一般名	バイオ後発品（バイオシミラー） 先行バイオ医薬品		採用区分	効能又は効果（赤字は先行バイオ医薬品にのみ適応あり）	薬価(円)
80%	インスリン グラルギン	後発	インスリングラルギンBS注キット「FFP」	院内外	○インスリン療法が適応となる糖尿病	970
		先行	―	―		―
		後発	インスリングラルギンBS注ミリオペン「リリー」	院内外		997
		先行	―	―		―
80%	エポエチン	後発	エポエチンアルファBS注750シリンジ「JCR」	院内	○透析施行中の腎性貧血 ○未熟児貧血	485
		先行	―	―		―
80%	ダルベポエチン アルファ	後発	ダルベポエチン アルファ注 5μgシリンジ「KKF」	院内	○腎性貧血 ○骨髄異形成症候群に伴う貧血 ○ベルズチファン投与に伴う貧血	412
		先行	―	―		―
		後発	ダルベポエチン アルファ注 10μgシリンジ「KKF」	院内		720
		先行	―	―		―
		後発	ダルベポエチン アルファ注 20μgシリンジ「KKF」	院内		1,260
		先行	―	―		―
		後発	ダルベポエチン アルファ注 30μgシリンジ「KKF」	院内		1,848
		先行	―	―		―
		後発	ダルベポエチン アルファ注 60μgシリンジ「KKF」	院内		3,188
		先行	―	―		―
		後発	ダルベポエチン アルファ注 120μgシリンジ「KKF」	院内		5,710
		先行	―	―		―
80%	テリパラチド	後発	テリパラチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	院内外	○骨折の危険性の高い骨粗鬆症	14,924
		先行	フォルテオ皮下注キット600μg	院外		20,071
80%	トラスツズマブ	後発	トラスツズマブBS点滴静注用150mg「NK」	院内	○HER2過剰発現が確認された乳癌 ○HER2過剰発現が確認された治癒切除不能な進行・再発の胃癌 **○HER2陽性の根治切除不能な進行・再発の唾液腺癌** ○がん化学療法後に増悪したHER2陽性の治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌	9,383
		先行	ハーセプチン注射用150	院内		22,063
		後発	トラスツズマブBS点滴静注用60mg「NK」	院内		4,033
		先行	―	―		―
80%	フィルグラスチム	後発	フィルグラスチムBS注75μgシリンジ「F」	院内	○造血幹細胞の末梢血中への動員 ○造血幹細胞移植時の好中球数の増加促進 ○がん化学療法による好中球減少症 ○ヒト免疫不全ウイルス（HIV）感染症の治療に支障を来す好中球減少症 ○骨髄異形成症候群に伴う好中球減少症 ○再生不良性貧血に伴う好中球減少症 ○先天性・特発性好中球減少症 ○再発又は難治性の急性骨髄性白血病に対する抗悪性腫瘍剤との併用療法 **○神経芽腫に対するジヌツキシマブ（遺伝子組換え）の抗腫瘍効果の増強**	1,942
		先行	―	―		―
		後発	フィルグラスチムBS注150μgシリンジ「F」	院内		3,165
		先行	グランシリンジ150	院内		7,947
		後発	フィルグラスチムBS注300μgシリンジ「F」	院内		5,012
		先行	―	―		―
80%	ラニビズマブ	後発	ラニビズマブ硝子体内注射用キット10mg/mL「センジュ」	院内	○中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性症 ○網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ○病的近視における脈絡膜新生血管 ○糖尿病黄斑浮腫 **○未熟児網膜症（※ルセンティス硝子体内注射液10mg/mLのみ適応）**	72,136
		先行	ルセンティス硝子体内注射用キット10mg/mL	院内		92,753
			ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL			108,517
80%	リツキシマブ	後発	リツキシマブBS点滴静注100mg「KHK」	院内	○CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫 ○免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患 ○多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎 ○既存治療で効果不十分なループス腎炎 ○下記のネフローゼ症候群 ・頻回再発型あるいはステロイド依存性のネフローゼ症候群 （小児期発症・**成人期発症**） ・難治性のネフローゼ症候群（頻回再発型、ステロイド依存性あ るいはステロイド抵抗性を示す場合） ○持続性及び慢性免疫性血小板減少症 ○後天性血栓性血小板減少性紫斑病 ○インジウム（111In）イブリツモマブ　チウキセタン（遺伝子組換え）注射液及びイットリウム（90Y） イブリツモマブ　チウキセタ ン（遺伝子組換え）注射液投与の前投 **○CD20陽性の慢性リンパ性白血病** **○自己免疫性溶血性貧血** **○全身性強皮症** **○難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡** **○視神経脊髄炎スペクトラム障害（視神経脊髄炎を含む）の再発予防** **○下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制** **腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植** **○下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の治療** **腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植**	9,274
		先行	リツキサン点静注100mg	院内		15,341
		後発	リツキシマブBS点滴静注500mg「KHK」	院内		44,485
		先行	リツキサン点静注500mg	院内		78,002

置き換え率※	一般名	バイオ後発品（バイオシミラー） 先行バイオ医薬品		採用区分	効能又は効果（赤字は先行バイオ医薬品にのみ適応あり）	薬価(円)
50%	アガルシダーゼ ベータ	後発	アガルシダーゼ　ベータBS点滴静注5mg「JCR」	院内	○ファブリー病	68,796
		先行	―	―		―
		後発	アガルシダーゼ　ベータBS点滴静注35mg「JCR」	院内		389,144
		先行	―	―		―
50%	アダリムマブ	後発	アダリムマブBS皮下注40mgペン0.4mL「CTNK」	院内外	○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎 ○中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る） ○X線基準を満たさない体軸性脊椎関節炎 ○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） **○化膿性汗腺炎** **○壊疽性膿皮症**	16,078
		先行	ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	院内外	○既存治療で効果不十分な下記疾患 ○尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬 ○強直性脊椎炎 ○腸管型ベーチェット病 ○非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 ○中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	40,275
		後発	アダリムマブBS皮下注80mgペン0.8mL「CTNK」	院内外	○中等症又は重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不十分な場合に限る） ○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） **○化膿性汗腺炎** **○壊疽性膿皮症** ○既存治療で効果不十分な下記疾患 ○尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬 ○強直性脊椎炎 ○腸管型ベーチェット病 ○非感染性の中間部、後部又は汎ぶどう膜炎 ○中等症又は重症の活動期にあるクローン病の寛解導入及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	33,549
		先行	ヒュミラ皮下注80mgペン0.8mL	院内外		83,873
50%	アフリベルセプト	後発	アフリベルセプト硝子体内注射用キット40mg/mL「バイエル」	院内	○中心窩下脈絡膜新生血管を伴う加齢黄斑変性 ○網膜静脈閉塞症に伴う黄斑浮腫 ○病的近視における脈絡膜新生血管 **○糖尿病黄斑浮腫（アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLのみ適応）** **○血管新生緑内障** **○未熟児網膜症（アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mLのみ適応）**	67,959
		先行	アイリーア硝子体内注射用キット40mg/mL	院内		99,522
			アイリーア硝子体内注射液40mg/mL			113,912
50%	インスリン アスパルト	後発	インスリンアスパルトBS注100単位/mLNR「サノフィ」	院外	○インスリン療法が適応となる糖尿病	208
		先行	ノボラピッド注100単位/mL	院外		158
		後発	インスリンアスパルトBS注カートNR「サノフィ」	院外		674
		先行	ノボラピッド注ペンフィル	院外		732
		後発	インスリンアスパルトBS注ソロスターNR「サノフィ」	院内外		1,213
		先行	ノボラピッド注フレックスタッチ	院外		1,380
50%	インスリン リスプロ	後発	インスリンリスプロBS注100単位/mLHU「サノフィ」	院内外	○インスリン療法が適応となる糖尿病	121
		先行	ヒューマログ注100単位/mL	院外		215
		後発	インスリンリスプロBS注カートHU「サノフィ」	院外		361
		先行	ヒューマログ注カート	院外		903
		後発	インスリンリスプロBS注ソロスターHU「サノフィ」	院内外		774
		先行	ヒューマログ注ミリオペン	院外		1,108
50%	インフリキシマブ	後発	インフリキシマブBS点滴注射用100mg「NK」	院内	○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○ベーチェット病による難治性網膜ぶどう膜炎 ○尋常性乾癬、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 強直性脊椎炎 腸管型ベーチェット病、神経型ベーチェット病、血管型ベーチェット病 ○次のいずれかの状態を示すクローン病の治療及び維持療法 （既存治療で効果不十分な場合に限る） ・中等度から重度の活動期にある患者 ・外瘻を有する患者 ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の治療（既存治療で効果不 十分な場合に限る） ○川崎病の急性期	14,500
		先行	レミケード点滴静注用100	院内		35,981
50%	ウステキヌマブ	後発	―	―	○中等症から重症の活動期クローン病の導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	―
		先行	ステラーラ点滴静注130mg	院内	**○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の寛解導入療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）**	178,043
		後発	ウステキヌマブBS皮下注45mgシリンジ「F」	院内	○既存治療で効果不十分な尋常性乾癬、乾癬性関節炎 **○中等症から重症の活動期クローン病の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）** ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	131,440
		先行	ステラーラ皮下注45mgシリンジ	院内		192,647
50%	エタネルセプト	後発	エタネルセプトBS皮下注25mgペン0.5mL「MA」	院内外	既存治療で効果不十分な下記疾患 ○関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） **○多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎（エンブレル皮下注用25mgのみ適応）**	5,532
		先行	エンブレル皮下注25mgペン0.5mL	院外		7,592
			エンブレル皮下注用25mg	院内外		12,337
		後発	エタネルセプトBS皮下注50mgペン1.0mL「MA」	院内外		10,463
		先行	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	院外		14,591

置き換え率※	一般名	バイオ後発品（バイオシミラー） 先行バイオ医薬品		採用区分	効能又は効果（赤字は先行バイオ医薬品にのみ適応あり）	薬価(円)
50%	ソマトロピン	後発	ソマトロピンBS皮下注10mg「サンド」シュアバル	院内外	○骨端線閉鎖を伴わない成長ホルモン分泌不全性低身長症 ○骨端線閉鎖を伴わない次の疾患における低身長 ・ターナー症候群 ・慢性腎不全 ・プラダー・ウィリ症候群 ○骨端線閉鎖を伴わないSGA（small-for-gestational age）性低身 長症 ○成人成長ホルモン分泌不全症（重症に限る） ○プラダー・ウィリ症候群における体組成異常	22,973
		先行	ジェノトロピンゴークイック注用12mg	院内外		52,414
50%	トシリズマブ	後発	トシリズマブBS点滴静注80mg「CT」	院内	○既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む）、多関節に活動性を有する若年性特発性関節炎、全身型若年性特発性関節炎 ○キャッスルマン病に伴う諸症状及び検査所見（C反応性タンパク高値、フィブリノーゲン高値、赤血球沈降速度亢進、ヘモグロビン低値、アルブミン低値、全身倦怠感）の改善。ただし、リンパ節の摘除が適応とならない患者に限る。 ○悪性腫瘍治療に伴うサイトカイン放出症候群 **○SARS-CoV-2による肺炎（ただし、酸素投与を要する患者に限る）** **○成人発症スチル病**	6,687
		先行	アクテムラ点滴静注用80mg	院内		9,973
		後発	―	―		―
		先行	アクテムラ点滴静注用200mg	院内		23,080
50%	ペグフィルグラスチム	後発	ペグフィルグラスチムBS皮下注3.6m g「モチダ」	院内	○がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制 **○造血幹細胞の末梢血中への動員（※ジーラスタ皮下注3.6mgのみ適応）**	55,680
		先行	ジーラスタ皮下注3.6mg	院内		77,753
			ジーラスタ皮下注3.6mgボディーポット	院内		90,969
50%	ベバシズマブ	後発	ベバシズマブBS点滴静注100mg「CTNK」	院内	○治癒切除不能な進行・再発の結腸・直腸癌 ○扁平上皮癌を除く切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌 ○手術不能又は再発乳癌 ○悪性神経膠腫 ○卵巣癌 **○進行又は再発の子宮頸癌** **○切除不能な肝細胞癌** **○神経線維腫症2型**	6,038
		先行	アバスチン点滴静注用100mg/4mL	院内		15,049
		後発	ベバシズマブBS点滴静注400mg「CTNK」	院内		22,709
		先行	アバスチン点滴静注用400mg/16mL	院内		56,525
対象外	オマリズマブ	後発	―	―	○気管支喘息（既存治療によっても喘息症状をコントロールできない難治の患者に限る） ○季節性アレルギー性鼻炎（既存治療で効果不十分な重症又は最重症患者に限る） ○特発性の慢性蕁麻疹（既存治療で効果不十分な患者に限る）	―
		先行	ゾレア皮下注75mgペン	院内外		11,700
		後発	―	―		―
		先行	ゾレア皮下注150mgペン	院内外		21,260
		後発	―	―		―
		先行	ゾレア皮下注300mgペン	院内外		39,329
対象外	ゴリムマブ	後発	―	―	○既存治療で効果不十分な関節リウマチ（関節の構造的損傷の防止を含む） ○中等症から重症の潰瘍性大腸炎の改善及び維持療法（既存治療で効果不十分な場合に限る）	―
		先行	シンポニー皮下注50mgオートインジェクター	院内外		100,813
対象外	デノスマブ	後発	―	―	○多発性骨髄腫による骨病変及び固形癌骨転移による骨病変 **○骨巨細胞腫**	―
		先行	ランマークHI皮下注120mgシリンジ1.0mL	院内		44,390

※置き換え率：同成分の総使用量に対するバイオシミラーの使用割合（バイオ後続品使用体制加算の算定要件）

適応症などの最終確認は最新の添付文書をご参照ください。

【参考資料】

- **令和８年度診療報酬改定について【医科全体版】（https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001745823.pdf）**
- **SAFE-DI（https://www.safe-di.jp/service）**
- **日本で承認されているバイオシミラー［2026年9月30日更新］（一般社団法人 日本バイオシミラー協議会）（https://www.biosimilar.jp/biosimilar_list.html）**
- **添付文書およびインタビューフォーム**