重要

2026年10月1号
薬剤部　薬品情報管理室

医薬品安全使用ニュース

手術前後に禁忌となる糖尿病治療薬の休薬について

概要


添付文書上、手術前後の患者に禁忌とされている糖尿病治療薬の休薬漏れに関する事例が2020年1月1日～2026年7月31日までに11件報告されています。

注意すべきポイント

SGLT2阻害薬やビグアナイド薬など、手術前後の患者に対して禁忌となっている糖尿病治療薬があります。
また、これらの成分を含む配合薬についても同様に休薬が必要ですが、名称がそれぞれ単独製剤の時と異なり判別しにくいケースもありますので注意が必要です。

例：スーグラ錠+ジャヌビア錠→スージャヌ配合錠

具体的な名称や休薬期間については、DIニュース等を参考にしてください。





参考資料
・医療事故情報収集等事業 医療安全情報No.238「手術前後の患者に禁忌の糖尿病治療薬の休薬漏れ」
https://www.med-safe.jp/pdf/med-safe_238.pdf
・日本医療機能評価機構 医療事故情報収集等事業第83回報告書（2025年）
https://www.med-safe.jp/pdf/report_83.pdf
・愛媛大学医学部附属病院DIニュース（薬剤部薬品情報管理室） 術前休薬インデックス、経口血糖降下薬一覧