

※使用時は添付文書で最終確認をお願いします

分類	選択的 DPP-4 阻害薬					GLP-1 受容体作動薬		
商品名	グラクティブ錠		エクア錠	ネシーナ錠		トラゼンタ錠	ビクトーザ皮下注	バイエッタ皮下注ペン
一般名	シタグリプチン		ビルダグリプチン	アログリプチン		リナグリプチン	リラグルチド (遺伝子組換え)	エキセナチド
								
規格	25mg	50mg	50mg	12.5mg (院外限定)	25mg	5mg (第三内科・臨検限定)	18mg	5 μ g 10 μ g (第三内科限定)
薬価	89. ⁵⁰ 円	166 円	97. ⁵⁰ 円	111. ²⁰ 円	207. ⁸⁰ 円	209. ⁴⁰ 円	9,960 円	9,661 円
投与経路	経口投与					皮下注射		
用法	1 日 1 回		1 日 2 回	1 日 1 回		1 日 1 回	1 日 1 回	1 日 2 回(食前)
用量 (1 回量)	50mg		50mg	25mg		5mg	0.9mg (0.3mg/回より開始)	5 μ g
最大量	100mg/日		100mg/日	25mg/日		5mg/日	0.9mg/日	20 μ g/日
腎機能 障害時	・重度では禁忌(透析患者 含む) ・中等度では減量 30 $\leq$ Ccr<50:25mg $\sim$ 50/回		中等度以上での安 全性は未確立	・中等度以上で減量 30 $\leq$ Ccr<50:12.5mg/回 Ccr<30:6.25mg/回		通常量可能	禁忌・減量の記載なし	・重度では禁忌(透析患者 含む) ・中等度・軽度での安全性 は未確立
併用可能 な糖尿病 治療薬	・SU 剤 ・ビグアナイド系薬 ・チアゾリジン系薬 ・ α -グルコシダーゼ阻害剤 ・インスリン製剤		・SU 剤	・SU 剤 ・ビグアナイド系剤 ・チアゾリジン系剤 ・ α -グルコシダーゼ阻害剤		なし	・SU 剤	・SU 剤 ・SU 剤 +ビグアナイド系薬 ・SU 剤 +チアゾリジン系薬
	※SU 剤またはインスリン製剤と併用する場合は、SU 剤またはインスリン製剤の減量を考慮する(併用による重篤な低血糖症の報告あり)							
注意事項			重度肝障害患者は 禁忌				インスリンの代替薬ではない (インスリン非依存状態の患者に用いる)	
主な代謝 経路	腎排泄		肝臓で代謝され 不活性型で腎排泄	腎排泄		胆汁排泄	—	腎臓で分解され消失
長期投与	○		○	○		2012 年 10 月より可	—	—