



当院採用の経皮吸収型製剤のはがれた場合の対処法



愛媛大学医学部附属病院 薬剤部
薬品情報管理室

商品名（製薬会社）	薬効分類	貼り直し	対処法
ニュープロパッチ （大塚製薬）	パーキンソン 治療薬	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。
イクセロンパッチ （ノバルティスファーマ）	アルツハイマ ー型認知症治 療薬	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ²⁾ 。
デュロテップ MT パッチ （ヤンセンファーマ）	鎮痛薬 （医療用麻薬）	△	気が付いた時点で新しいものを貼付し、 貼り直した日から 3 日毎 に貼り替え ⁴⁾ 。
ノルスパンテープ （久光製薬）	鎮痛薬	△	粘着力が弱くなった場合は直ちに新しいものを貼付し、 貼り直した日から 7 日毎 に貼り替え ¹⁾ 。
ホクナリンテープ （マイラン EPD 合同会社）	気管支拡張薬	×	貼付から 12 時間以上経過し症状が落ち着いている場合は、次回の貼付時間になってから新しいものを貼付 ³⁾ 。貼付から 12 時間以内の場合は気が付いた時点で新しいものを貼付。次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。
フランドルテープ （トーアエイヨー）	狭心症治療薬	○	清潔なタオルなどでテープ全体の水分を吸い取り、シワを良くのばしてから再貼付可 ³⁾ 。貼り直す際に貼付部位を変える ³⁾ 。
ビソノテープ （トーアエイヨー）	降圧薬	△	次回の貼付時間になってから新しいものを貼付 ³⁾ 。
ミリステープ （日本化薬）	狭心症、急性 心不全治療薬	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。
ジドレンテープ （田辺三菱）	狭心症治療薬	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。
エストラーナテープ （久光製薬）	女性ホルモン 製剤	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。 ※次回の貼り替えのタイミングは医師に要相談
ニコチネル TTS （ノバルティスファーマ）	禁煙補助薬	△	新しいものを推奨。しかし、粘着力低下の場合はテープ等で固定をして再貼付も可 ⁴⁾ 。次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ⁴⁾ 。
ネオキシテープ （久光製薬）	過活動膀胱治 療薬	×	気が付いた時点で新しいものを貼付し、次回はいつも貼り替えていた時間に貼り替え ²⁾ 。

○：再貼付可 ×：再貼付不可 △：粘着力低下の場合、テープ等で固定し再貼付可

参考文献：適正使用ガイド¹⁾、IF²⁾、製薬会社 HP³⁾、製薬会社問い合わせ⁴⁾