

当院採用の脂質異常症治療薬一覧

分類	一般名	商品名	採用	薬価	写真	用法・用量	併用禁忌	禁忌		HDL-C	LDL-C	作用機序・特徴など		
								肝障害	腎障害					
(スタチン) HMG-CoA還元酵素阻害薬	アトルバスタチンカルシウム	アトルバスタチン錠5mg「DSEP」	院内外	22.90円/錠		1日1回10mg経口投与	フィbrate系薬剤、テラプレビル、オムビタスピル・パリタプレビル・リナビル配合錠	不可	不可	↑	↓↓↓	CYP3A4で代謝される		
		アトルバスタチン錠OD10mg「トーフ」	院内外	43.50円/錠										
	ビタバスタチンカルシウム	ビタバスタチンCa・OD錠2mg「MEEK」	院内外	46.30円/錠		1日1回1～2mg経口投与	フィbrate系薬剤、シクロスポリン	不可	不可	↑	↓↓↓	HMG-CoA還元酵素の選択的阻害： ストロンクスタチン (LDL-C低下作用強い)	CYPの代謝を受けない	
		リバロOD錠1mg	院外	58.70円/錠										
	ロスバスタチンカルシウム	クレストールOD錠	2.5mg	院内外	63.10円/錠		1日1回2.5mgより投与を開始	フィbrate系薬剤、シクロスポリン	不可	不可	↑	↓↓↓	CYP2C19、2C9で代謝 (一部CYP2D6、3A4で代謝)	
			5mg	院外	121.30円/錠									
	シンバスタチン	リボバス錠5	院外	102.20円/錠		1日1回5mg経口投与	フィbrate系薬剤、イトラコナゾール、ミコナゾール、アダザナビル、サキナビル、テラプレビル、コビシタット	不可	不可	↑	↓↓↓	CYP3A4で代謝される		
	プラバスタチンナトリウム	プラバスタチンNa錠10mg「トーフ」	院内外	33.70円/錠		1日10mgを分1または分2で経口投与	フィbrate系薬剤	可	不可	↑	↓↓↓	HMG-CoA還元酵素の選択的阻害： スタンダードスタチン	CYPの代謝を受けない	
		メバロチン錠5	院外	45.50円/錠										
	フルバスタチンナトリウム	ローコール錠20mg	院内外	62.30円/錠		1日1回20～30mg夕食後経口投与	フィbrate系薬剤	不可	不可	↑	↓↓↓	CYP2C9で代謝 抗酸化作用強い		
膽イオン交換樹脂	コレステミド	コレバインミニ83%	院内外	50.40円/g		1回1.81gを1日2回朝夕食前に経口投与	-	可	可	↑	↓↓	・腸管内で胆汁酸と結合し、コレステロールの吸収阻害 ・体内に吸収されない		
プロブコール	プロブコール	ロレルコ錠250mg	院内外	20.20円/錠		1日500mgを分2で食後経口投与	-	可	可	↓↓	↓	・胆汁中へのコレステロール異化排泄を促進 ・抗酸化作用あり		
フィbrate系薬	フェノフィbrate	リビディル錠53.3mg	院内外	28.40円/錠		1日1回106.6mg～160mgを食後経口投与	HMG-CoA還元酵素阻害薬	不可	不可	↑↑	↓	・核内受容体 (PPARα) を活性化して種々の蛋白質の発現を調節することにより脂質代謝を総合的に改善させる ・TG低下作用あり		
	ベザフィbrate	ベザフィbrate SR錠200mg「ザワイ」	院内外	9.90円/錠		1日400mgを2回に分けて朝夕食後に経口投与	HMG-CoA還元酵素阻害薬	可	不可					
小腸コレステロールトランスポーター阻害薬	エゼチミブ	ゼチーア錠10mg	院内外	185.30円/錠		1回10mgを1日1回食後経口投与	※HMG-CoA還元酵素併用で肝機能障害	不可※	可	↑	↓↓	食事性及び胆汁性コレステロールの吸収を阻害		
ニコチン酸系薬	トコフェロールニコチン酸エステル	ユベランカプセル100mg	院内外	5.80円/カプセル		1日300～600mgを3回に分けて経口投与	-	可	可	↑	↓	・コレステロール、中性脂肪、リン脂質等の脂質代謝を改善する 食後投与はAUCが29倍		
	ニセリトール	ベリシット錠250mg	院外	13.80円/錠		1日750mgを毎食直後3回に分けて経口投与	-	可	可			・血管壁に直接作用して、微小循環の持続的な血流増加を示す 副作用(潮紅、熱感)を避ける為に食後投与が望ましい		
多価不飽和脂肪酸	イコサペンタ酸エチル(EPA)	エバデールカプセル	300	院外	38.50円/カプセル		高脂血症：1回900mgを1日2回又は1回600mgを1日3回、食直後に経口投与 閉塞性動脈硬化症に伴う潰瘍、疼痛及び冷感の改善：1回600mgを1日3回、毎食直後に経口投与	-	可	可	-	-	・肝臓でのTG産生を抑制し、LPL活性化を促進する ・空腹時投与は吸収が悪い ・血小板凝集抑制作用あり	
		エバデールS	600	院外	73.20円/包									
	オメガ-3脂肪酸エチル	ロトリガ錠状カプセル2g	院内外	261.10円/包		1回2gを1日1回、食直後に経口投与							2g中EPA930mg、ドコサヘキサエン酸エチル(DHA) 750mg含有	
PCSK9阻害薬	エボロクマブ	レバーサ皮下注140mgシリンジ	院内	22948.00円/本		家族性高コレステロール血症ヘテロ接合体及び高コレステロール血症：140mgを2週間に1回又は420mgを4週間に1回皮下投与 家族性高コレステロール血症ホモ接合体：420mgを4週間に1回皮下投与	-	可	可	↑	↓↓↓	LDL受容体分解促進タンパク質であるPCSK9と結合し、PCSK9のLDL受容体への結合を阻害 必ずHMG-CoA還元酵素阻害薬と併用すること		
	アリロクマブ	ブラレント皮下注75mgペン	院内	22948.00円/本		家族性高コレステロール血症及び高コレステロール血症：75mgを2週に1回皮下投与 ※ホモ接合体については有効性及び安全性が確立していない	-	可	可	-	↓↓↓			

<参考>今日の治療薬2016、薬が見えるvol.2、治療薬ハンドブック2012、第5版疾患と今日の処方、薬剤師のための疾患別薬物療法IV、添付文書、IF

↓↓↓：≦-25% ↓↓↓：-20～-25% ↓：-10～-20%
↑↑↑：≧30% ↑↑：20～30% ↑：10～20% -：-10～-10%