

## DEHP(フタル酸エステル)フリー指定の薬剤一覧

ポリ塩化ビニル（PVC）製の医療用具は、柔軟性・耐久性等に優れていることなどから、医療の場で広く使用されています。一方、ポリ塩化ビニルは、その特性である優れた柔軟性を保持するために、材質中に可塑剤として **DEHP** が添加されており、薬剤によっては **DEHP が溶出してくることが知られています**。これら薬剤を使用する場合、DEHP フリーの輸液セットであることを確認してください。

### DEHP(フタル酸エステル)フリー指定の薬剤一覧

医薬品名	添付文書
アムビゾーム点滴静注用 50mg	避けることが望ましい
アンカロン注 150	使用を避けること
イントラリポス輸液 10%・20%	避けることが望ましい
エトポシド点滴静注液 100mg「サンド」	使用を避けること
エネーボ配合経腸用液	避けることが望ましい
エルネオパ 1・2 号輸液	避けることが望ましい
エレンタール配合内用剤・P 乳幼児用	避けることが望ましい
エンシュア・リキッド, エンシュア・H	避けることが望ましい
オーツカ MV 注	避けることが望ましい
ケイツーN 静注 10mg	避けることが望ましい
サンディミュン点滴静注用 250mg	使用を避けること
ジェブタナ点滴静注 60mg	使用を避けること
1%ディプリバン注ーキット 500mg	避けることが望ましい
トーリセル点滴静注液 25mg	使用を避けること
パクリタキセル注 30mg・100mg「ホスピーラ」	使用を避けること
ビタジェクト注キット	避けることが望ましい
フルカリック 1・2・3 号輸液	避けることが望ましい
プログラフ注射液 2mg	使用を避けること
1%、2%プロポフォール注「マルイシ」	避けることが望ましい
ベネフィクス静注用 1000	使用を避けること
ミリプラ動注用 70mg・懸濁用液 4mL	DEHP を含まないカテーテル、延長チューブ等を使用すること
ラコール NF 配合経腸用液・半固形剤	避けることが望ましい
リピオドール 480 注 10mL	DEHP を含まないカテーテル、延長チューブ等を使用すること
リプルキット注 10 µg	避けることが望ましい
ロピオン静注 50mg	避けることが望ましい