

【注意喚起】テモゾロミド製剤の休薬期間について

抗悪性腫瘍剤のテモゾロミドを処方するにあたっては、用法用量と共に**服用期間、休薬期間**についても十分に確認するようお願い致します。

後 発 医 薬 品 (当 院 採 用)			
テモゾロミド錠 100mg「NK」		テモゾロミド錠 20mg「NK」	
先 発 医 薬 品			
テモダールカプセル 100mg		テモダールカプセル 20mg	

・用法及び用量(添付文書記載より)

<悪性神経膠腫初発の場合>

放射線照射との併用にて、通常、成人ではテモゾロミドとして

1回 **75mg/m²(体表面積)**を1日1回連日 **42日間**、経口投与し、**4週間休薬する**。

その後、本剤単独にて、テモゾロミドとして

1回 **150mg/m²(体表面積)**を1日1回連日 **5日間**、経口投与し、**23日間休薬する**。

この28日を1クールとし、次クールでは1回 200mg/m²に増量することができる。

<悪性神経膠腫再発の場合>

通常、成人ではテモゾロミドとして

1回 **150mg/m²(体表面積)**を1日1回連日 **5日間**、経口投与し、**23日間休薬する**。

この28日を1クールとし、次クールで1回 200mg/m²に増量することができる。

<再発又は難治性のユーイング肉腫> ※公知申請、先発医薬品の「テモダール」のみ

イリノテカンと併用において、通常、テモゾロミドとして

1回 **100mg/m²(体表面積)**を1日1回連日 **5日間**投与し、**16日間以上休薬する**。

これを1クールとし、投与を反復する。なお、患者の状態により適宜減量する。