

# エイベリス®点眼液 0.002%適正使用のお願い

選択的 EP2 受容体作動薬、緑内障・高眼圧症治療剤

## エイベリス点眼液 0.002%

**【禁忌】** 1.無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者

2.タフルプロストを投与中の患者

→ タプコム配合点眼液、タプロス点眼液など

3.本剤の成分に対し過敏症の既往歴のある患者

**【効能・効果】** 緑内障、高眼圧症

**【用法・用量】** 1 回 1 滴、1 日 1 回点眼する。

**【主な副作用】** 嚢胞様黄斑浮腫を含む黄斑浮腫、結膜充血



**「無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者」**

**は禁忌です。**

**本剤処方前に該当しないことをご確認ください。**

国内で実施された本剤の臨床試験の結果より、本剤を「無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者」に投与した場合、黄斑浮腫が発現する可能性が高いことから「無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者」は禁忌に設定されております。

「無水晶体眼又は眼内レンズ挿入眼の患者」に対して本剤が投与されることのないよう、下記の点についてご確認くださいませようお願い申し上げます。

- 眼科検査を実施し、無水晶体又は眼内レンズ挿入眼でないこと。
- カルテや患者様の問診等により、白内障手術歴を有さないこと。

