

リツキシマブ投与患者

- ・CD20陽性のB細胞性非ホジキンリンパ腫
- ・免疫抑制状態下のCD20陽性のB細胞性リンパ増殖性疾患
- ・多発血管炎性肉芽腫症、顕微鏡的多発血管炎
- ・**既存治療で効果不十分なループス腎炎**
- ・慢性特発性血小板減少性紫斑病
- ・後天性血栓性血小板減少性紫斑病
- ・インジウム (111In) イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え) 注射液およびイットリウム (90Y) イブリツモマブ チウキセタン (遺伝子組換え) 注射液投与前投与

- ・CD20陽性の慢性リンパ性白血病
- ・難治性のネフローゼ症候群(頻回再発型あるいはステロイド依存性を示す場合)
- ・全身性強皮症
- ・難治性の尋常性天疱瘡及び落葉状天疱瘡
- ・視神経脊髄炎スペクトラム障害(視神経脊髄炎を含む)の再発予防
- ・下記の臓器移植における抗体関連型拒絶反応の抑制、治療
腎移植、肝移植、心移植、肺移植、膵移植、小腸移植

入院患者

外来患者

先発品の投与有無

既に先発品を投与されている(継続投与)
または初回投与後に他院で治療を受ける

初回投与
かつ継続的に当院で治療を受ける

リツキシマブBS点滴静注「KHK」
(バイオシミラー)

リツキサン点滴静注
(先発品)