

患者に適した簡易懸濁の提案

プレアボイドとは薬学的ケアから患者の不利益（副作用、相互作用、治療効果不十分など）を回避あるいは軽減した事例を意味します。今回は患者の服用状況や医師の処方希望薬剤の特性を考慮し最適な投与法を提案することで、よりよい医療の提供に貢献できた事例を紹介いたします。

患者背景

・心原性脳梗塞・急性期の精査加療目的にて治療中の患者。

上記疾患に対してNOAC（新規経口抗凝固薬：Novel Oral Anti Coagulants: NOAC）の新規処方を検討中であり、担当医師より剤形について相談を受ける。

Sさん



医師

エリキュース®を粉砕して処方しようかと思うんだけど、粉砕していい薬剤ですか？



エリキュース®は粉砕後の有効性や安定性に関するデータがないので、粉砕はおすすめできません。

では他のNOACで粉砕可能なものはありますか？



リクシアナ®やイグザレルト®は粉砕可能ですが、患者さんは粉薬を希望されているのでしょうか。

入院中のSさんに新しく処方しようと思っています。内服薬は経管投与になると思います。



でしたらエリキュース®は簡易懸濁が可能な薬剤ですので、**簡易懸濁法**を用いて投与されてはどうでしょうか。**55度の白湯に5分ほど放置すると溶解します**ので、より簡単に投与できるようになると思います。

なるほど。だったらそのほうがいいね。エリキュース®にします。ありがとう。



薬剤師



医師の相談を受け、患者に適した投与方法を提案することでより良い医療の提供に貢献できた。また簡易懸濁法を提案することにより粉砕による調剤ロスや調剤時間の短縮になり、業務の効率化にも貢献できた。

医薬品情報WEB検索システム MDview

エリキュース錠5mg

院内外用薬品

表示設定

標準薬効 経口FXa阻害剤

薬効分類 代謝性医薬品

- 血液・体液用薬
 - 血液凝固阻害剤 (全薬品から 採用薬品から)
 - その他/動物製剤の血液凝固阻害剤 (全薬品から 採用薬品から)

同一成分 同一規格 全薬品から 採用薬品から

相互作用相手薬品一覧 禁忌 (全薬品から 採用薬品から)

簡易懸濁情報(詳細)

剤皮	フィルム錠	性状・製剤特徴/酸・アルカリの安定性
適否	適1	水(約55°C) 5分10分
	最小通過サイズ	8Fr. 破壊→水 5分10分
備考		



MDview(院内イントラネット)の薬品検索ページでも簡易懸濁情報が確認できるようになりました！ぜひご参照ください。