

整形外科

適応	レジメン名	抗がん剤一般名	用量	用法	時間	投与日	1クール
骨肉腫	大量MTX(Day0-7)	メトレキサート(MTX)	8000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	160ml/h	day 1	7日
骨肉腫	大量MTX(Day8-15)	メトレキサート(MTX)	8000mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	160ml/h	day 1	14日
骨軟部悪性腫瘍	CDDP+ADM	シスプラチン(CDDP)	120mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	2時間	day 1	21日
		ドキシソルピシン(DXR)	30mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1・2	
骨軟部悪性腫瘍	IFO/VP-16	安息香酸Naカフェイン	2850mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-3	21日
		イホスファミド(IFM)	3g/m <sup>2</sup>	点滴静注	160ml/h	day 1-3	
		エトポシド(ETP)	60mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	160ml/h	day 1-3	
骨軟部悪性腫瘍	VDC	ビンクリスチン(VCR)	2mg	静脈注射		day 1	7日
		ドキシソルピシン(DXR)	45mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	day 1・2	
		シクロホスファミド(CPA)	500mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	day 1・2	
		安息香酸Naカフェイン	2850mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-3	
骨軟部悪性腫瘍	VAC	ビンクリスチン(VCR)	2mg	静脈注射		day 1・4	8日
		アクチノマイシンD(ACT-D)	15 μg/kg	静脈注射		day 1-5	
		シクロホスファミド(CPA)	300mg/m <sup>2</sup>	点滴静注	3時間	day 1-3	
		安息香酸Naカフェイン	2850mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-3	
骨軟部悪性腫瘍	ADM-IFO	ドキシソルピシン(DXR)	25mg/m <sup>2</sup>	持続静注	24時間	day 1-3	21日
		イホスファミド(IFM)	2g/m <sup>2</sup>	点滴静注	4時間	day 1-5	
デスモイド腫瘍	MTX+VLB	メトレキサート(MTX)	30mg/m <sup>2</sup>	静脈注射		day 1	7日
		ビンブラスチン(VLB)	6mg/m <sup>2</sup>	静脈注射		day 1	